

## Nieuwe Zorgmodule Diabetische Voetulcera

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera gaat per 1 januari 2021 van kracht. De nieuwe zorgmodule sluit beter aan bij de vigerende Richtlijn Diabetische Voet 2017. Deze wijziging heeft gevolgen voor de POH en huisarts in de praktijk.

De belangrijkste punten op een rijtje:

- Eindstadium nierfalen of een nierfunctie vervangende therapie valt onder Sims 3;
- De combinatie van Sims 1, zorgprofiel 2 bestaat niet meer en komt dus te vervallen;
- De definitie van lokaal verhoogde druk is aangescherpt, en luidt "Overmatige lokale eeltvorming (inclusief likdoorns) en/of lokale ontstekingsverschijnselen zoals zwelling, roodheid, of warmte en/of intra- of subcutane bloeding en/of blaarvorming." Tekenen van lokaal verhoogde druk vallen onder een zorgprofiel 3 classificatie wanneer ze in combinatie met neuropathie en/of vaatlijden aanwezig zijn;
- Indien er een herhalend gebruik van een interventie nodig is om een drukplek onder controle te houden, blijft een patiënt binnen zorgprofiel 3 behandeld. Indien een eenvoudige maatregel voor een permanente oplossing zorgt, wordt de patiënt teruggezet in een lager zorgprofiel;
- Een patiënt met Sims 1 op basis van vaatlijden kan, afhankelijk van zijn of haar ernst van vaatlijden, in overleg met de hoofdbehandelaar in een hoger zorgprofiel worden geplaatst;

### Nieuwe Sims classificatie en zorgprofielen:

Risicoclassificatie volgens Sims	Indicatie	Zorgprofiel
0 (laag risico)	Geen verlies PS Geen aanwijzingen voor PAV	-
1 (licht verhoogd risico)	Verlies PS of Aanwijzingen voor PAV* <i>NB Geen tekenen van lokaal verhoogde druk aanwezig!</i>	1
2 (hoog risico)	Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV <i>NB Geen tekenen van lokaal verhoogde druk aanwezig!</i>	2
2 (hoog risico)	Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk of Verlies PS in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk of Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV en tekenen van lokaal verhoogde druk	3
3 (sterk verhoogd risico)	Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis of Inactieve Charcot-voet of Eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse)	4
* Hierbij moet worden opgemerkt dat mensen met Sims 1 en ernstige perifere ischemie op basis van PAV buiten het bestek van deze afspraken vallen, en individueel door de hoofdbehandelaar moeten worden beoordeeld op zorgbehoefte.		

Klik [hier](#) voor het gehele document Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera.

Klik [hier](#) voor de samenvattingskaart Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera.

